OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
(Prix du présent fascicule : 3 fr. 50)

12,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

VINGT-ET-UNIÈME FASCICULE

(4 octobre 1916)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1916

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

En tête de ce nouveau fascicule, je crois devoir donner quelques indications sur le contenu des vingt premiers de cette publication spéciale réservée aux Coléoptères exotiques.

Ceux-ci contiennent, en plus de quelques synopsis et des notes sur divers insectes déjà connus, les descriptions ou diagnoses de :

Soixante genres ou sous-genres,

Mille quatre-vingt-une espèces.

Cent-quarante sept variétés.

Elles se rapportent à beaucoup de familles, et parmi celles-ci figurent de nombreux *Clavicornes* (de différents groupes), *Malacodermes*, *Hétéromères* et *Phytophages*.

Sous un titre unique : *Descriptions abrégées diverses*, déjà employé précédemment, seront décrits ici des genres ou sous-genres nouveaux, des espèces et variétés nouvelles rentrant dans plusieurs familles.

Tous les types des nouveautés décrites dans ce fascicule font partie de ma collection.

DESCRIPTIONS ABRÉGÉES DIVERSES

Ptilodactyla testaceicollis n. sp. Subovatus, griseo pubescens, nitidus, infra rufus, supra niger, thorace et macula humeralis testaceis, antennis nigris, pedibus testaceis. Long. 4 mill. Bolivie. — Peut se placer près de *P. humerosa* Champ., et distinct, à première vue, par le prothorax entièrement testacé.

Ptilodactyla Germaini n. sp. Oblongo-elongatus, griseo pubescens, nitidus, niger, antennis, tibiis tarsisque testaceis, elytris nigris, ad humeros testaceo maculatis. Thorace densissime punctato, elytris lineato punctatis. Long. 2,5 mill. Bolivie (Germain). Peut se placer près de *P. montana* Champ.

Ptilodactyla nigronotata n. sp. Oblongo-elongatus, griseo pubescens, nitidus, testaceus, oculis antennisque nigris, his articulis 2 primis testaceis aut rufis, elytris ad medium sat late nigro notatis. Long. 3 mill. République Argentine. — En outre de la coloration différente, plus large que le précédent, avec le prothorax moins densément ponctué.

Ptilodactyla atrosuturalis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, antennis pro parte verticeque obscurioribus, elytris ad suturam nigro notatis. Long. 4 mill. Brésil. — Cette espèce est bien distincte de la précédente, ainsi que des autres connues, par sa bande suturale noire allant en s'atténuant progressivement en arrière sans atteindre le sommet des élytres.

Ptilodactyla suturalis n. sp. Oblongo-elongatus,

parum nitidus et mediocre griseo pubescens, niger, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris testaceis, ad suturam antice nigro vittatis. Long. 4 mill. Colombie : Bogota. — Très voisin du précédent avec la ponctuation du prothorax un peu ruguleuse et plus dense, en outre, coloration différente et bande suturale plus large

Ptilodactyla bogotensis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, capite antice, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris apice late et ad humeros longe testaceo notatis. Long. 4 mill. Bogota. — Voisin du précédent, coloration différente, prothorax moins étroit par rapport aux élytres.

Ptilodactyla rufocincta n. sp. ♂ Oblongus, postice attenuatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, antennis ad basin, thorace antice breve, scutello femoribusque rufo-testaceis, elytris breve rufo-cinctis, his irregulariter griseo maculatis ; thorace dense punctato, antennis ramulosis. Long. 4 mill. Brésil. — Par ses macules élytrales pubescentes, se rapproche de *P. ornata* Cast., mais la coloration est plus foncée.

Ptilodactyla rufoscutum n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, luteo pubescens, nigro-piceus aut pro parte brunnescens, scutello, antennis pedibusque rufo-testaceis, elytris piceis, post basin late rufo notatis (*forma typica*), aut minute et multi rufo maculatis (**v. Fergussoni**). Thorace mediocre punctato, elytris substriatis. Long. 7 mill. Nouvelle Guinée et Iles Fergusson. — Espèce très distincte par sa coloration et pouvant se placer près de *P. Australis* Bourg.

Ptilodactyla pallidipes n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, antennis ad basin et epipleuris rufescentibus, pedibus abdomineque apice pallido-testaceis. Thorace sat dense punctato-pupillato, lateraliter deplanato ; elytris elongatis, substriatis. Variat : colore rufo testaceo et antennis testaceis (**v. nov. mauso-**

nensis). Long. 6-7 mill. Tonkin : Monts Mauson. — Plus allongé que le précédent, avec la ponctuation différente du prothorax qui, en outre, est nettement explané postérieurement.

Ptilodactyla tonkinea n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger, scutello pedibusque rufescentibus ; thorace in disco sparse et simplice punctato ; elytris satis latis, substriatis. Long. 7 mill. Tonkin. — Moins allongé que le précédent, avec la ponctuation du prothorax différente.

Ptilodactyla angustatipennis n. sp. Angustatus, subparallelus, postice parum attenuatus, nitidus, griseo pubescens, rufo-piceus, antennis, pedibus et infra corpore plus minusve testaceis ; thorace sat sparse pupillato-punctato ; elytris parum striatis aut lineato-punctatis. Long. 6 mill. Indes : Tenasserim. — Plus allongé que *P. pallidipes* mihi avec la ponctuation plus écartée sur le prothorax.

Cantharis swampingana n. sp. Elongatus, postice paulum attenuatus, nitidus, niger, thorace abdomineque testaceis. Long. 10 mill. Chine : Swamping. — Voisin de *C. subarcuatipes* Pic, en diffère par le prothorax plus étroit et moins rétréci en avant, les élytres plus noirs et à peine élargis avant leur milieu.

Cantharis 4-cyaneomaculata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, niger, infra corpore et articulo primo antennarum testaceis, capite pro parte thoraceque rufis, nigro notatis, scutello testaceo, elytris testaceis, ad basin et apice late cyaneo notatis. Variat : elytris testaceis, apice cyaneo notatis (**v. nov. bicyaneomaculata**). Long. 10-11 mill. Indes. — Ressemble à *C. cæruleomaculata* Koll. et Redt., mais prothorax maculé de noir sur le disque, élytres plus atténués postérieurement, etc.

Cantharis limbolaria v. nov. fainanensis. Elytris nigro-plumbeis, antice lateraliter et minute testaceo marginatis. Formose : Fainam.

Cantharis ceylonica n. sp. Minutus, subparallelus, nitidus, niger, capite, thorace, scutello pedibusque anticis rufo-testaceis ; elytris nigris, ad basin late luteo notatis. Capite satis lato, oculis prominulis ; thorace subtransverso, lateraliter subsinuato, in disco sulcato. Long. 5 mill. Ceylan. — Voisin de *C. latefulva* Pic, base des élytres plus courtement marquée de jaune, tête entièrement rousse, etc.

Ptinus thibetanus n. sp. Fulvo-testaceus, pro parte nitidus, griseo pubescens et longe luteo pilosus. Thorace dense luteo pubescente, 4 tuberculato, antice in medio late sulcato et lateraliter impresso ; elytris subovatis, humeris nullis, fortiter lineato-punctatis, intervallis subconvexis ; femoribus clavatis. Long. 3 mill. Thibet. — Voisin de *P. sulcithorax* Pic, mais tibias postérieurs à peine arqués, prothorax faiblement sillonné sur son disque postérieurement, etc.

Zonabris Maindroni n. sp. Parum elongatus, obscure pubescens, nitidus, elytris subopacis, niger, elytris rufo trifasciatis, fascia basali reducta ; antennis nigris, apice acuminatis ; thorace antice strangulato. Long. 13 mill. Indes Mér. : Wallardi. Reçu autrefois de M. Maindron. — Voisin de *Z. sidæ* F., et distinct par la base des élytres fasciée, et non bimaculée, de roux.

Zonabris subviridiceps n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo aut obscure pubescens, nigro-subviridescens, elytris nigris, ad et post medium testaceo fasciatis (fasciis rufo tinctis), antennis testaceis, ad basin nigris. Long. 17 mill. Laos. — Ressemble à *Z. submetalliceps* Pic, mais antennes en majeure partie testacées.

Zonabris subcircumflexa n. sp. Parum elongatus, subnitidus, griseo aut obscure pubescens, niger, elytris rufis, ad basin breve, ad apicem late nigris et ante apicem macula nigra circumflexa ornatis ; antennis rufis, ad basin nigris. Long. 17-18 mill. Dahomey. — A placer près de *Z. ustulata* Reiche.

Zonitomorpha externenotata n. sp. Nitidus, testaceus, articulis 5-11 antennarum, oculis et tarsis posticis nigris, elytris lateraliter post humeros nigro maculatis, his satis latis, sat dense et irregulariter punctatis ; thorace longissimo, sparse punctato. Long. 13 mill. Laos : Vientiane (ex Vitalis). — Diffère, à première vue, de *Z. Le Moulti* Pic, par les élytres plus brillants et brièvement maculés de foncé.

Zonitis semicæruleus n. sp. Satis latus, antice attenuatus, nitidus, testaceus, labro, palpis, antennis pedibusque pro majore parte (femoribus ad basin testaceis) nigris, elytris nigro-cœruleis. Capite elongato ; thorace satis breve, sparse punctato ; elytris latis et brevibus, apice paulum dilatatis. Long. 10 mill. Nouvelle Guinée. — Voisin de *Z. Latreillei* Cast., distinct à première vue par la tête testacée.

Zonitis validiceps n. sp. Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, testaceus, oculis, antennis, palpis pedibusque nigris, elytris testaceis, apice sat late nigro notatis. Capite breve et lato ; thorace parum elongato, antice attenuato, impresso-punctato ; elytris parallelis, densissime punctato-rugulosis ; pedibus validis. Long. 11 mill. Côte d'Ivoire. — Ressemble à *Z. sikkimensis* Pic, moins allongé pattes plus courtes et noires, etc.

Zonitis amboinensis n. sp. Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, pallido-testaceus, antennis, articulo primo rufo excepto, tibiis pro parte tarsisque nigris. Capite satis elongato ; thorace satis elongato, antice attenuato et parum dense punctato ; elytris subparallelis, postice parum dilatatis. Long. 12 mill. Amboine. — Voisin de *Z. batjanensis* Pic, tête moins large par rapport à la partie antérieure du prothorax, premier article des antennes roux et pattes en partie testacées.

Zonitis dilatipes n. sp. Elongatus, antice attenuatus, nitidus, mediocre pubescens, niger, capite, thorace, scu-

tello, coxis geniculisque testaceis. Capite elongato, postice truncato ; thorace satis elongato, antice valde attenuato, sulcato ; elytris ad medium minute strangulatis ; pedibus validis, tibiis anticis et intermediis minute dilatatis. Long. 11 mill. Brésil : Sancta Catherina. — Voisin de *Z. surinamensis* Pic, et distinct, à première vue, par la coloration testacée de la tête et de l'écusson.

Zonitoides palabuanensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, griseo pubescens, pallido-testaceus, oculis, antennis, articulis 2 primis testaceis exceptis, tibiis apice tarsisque nigris. Long. 12 mill. Java : Palabuan. — Diffère de *Z. celebensis* Pic, en outre de la coloration plus claire des antennes et celle des tarses foncée, par les élytres un peu plus larges et concolores.

Nemognatha testaceiceps n. sp. Robustus, nitidus, parum pubescens, testaceus, infra corpore, antennis, articulo primo rufo excepto, geniculis tarsisque nigris, elytris testaceis, in disco longitudinaliter piceo vittatis. Capite robusto, inæquale ; thorace breve, transverso ; elytris satis brevibus, pro parte subalutaceis. Long. 14 mill. Cuba. — Diffère de *N. cubæcola* J. Duv., par la tête testacée et les élytres à bande discale foncée plus ou moins étendue.

Lytta atroscutellaris n. sp. Angustatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-plumbeus, thorace rufo, in disco piceo maculato. Capite satis elongato ; thorace elongato, antice valde attenuato, subsulcato, sparse punctato ; elytris parallelis, minute ruguloso-punctatis. Long. 12 mill. Côte d'Ivoire. — Très voisin de *L. rufoscutellaris* Pic, et distinct, à première vue, par l'écusson foncé et la coloration plus foncée des élytres et des pattes.

Lytta trinotaticeps n. sp. Elongatus, nitidus, elytris subopacis, dense pubescentibus, nigro-plumbeus, capite nigro, rufo trimaculato, thorace rufo, in disco nigro bimaculato, scutello pro parte tibiisque testaceis. Long. 23 mill. Afrique Australe : Karibib. — Voisin de *L. bisignata* Makl.,

mais coloration de la tête différente, faite d'une grande macule médiane et d'une petite derrière chaque œil et écusson plus ou moins testacé.

Lytta travancorensis n. sp. Elongatus, nitidus, mediocre pubescens, niger, thorace, scutello abdomineque apice testaceis, capite inter oculos parum distincte rufo notato. Capite lato ; thorace elongato, antice valde attenuato, sulcato, irregulariter et fortiter punctato ; elytris plus ♂, minusve ♀, elongatis, ruguloso punctatis. Long. 13-14 mill. Indes : Wallardi. — Voisin de *L. ardosia* Frm., mais coloration élytrale plus noire, sommet de l'abdomen testacé, etc.

Lytta (Epicauta) testaceicornis n. sp. Angustatus, niger, plus minusve dense griseo pubescens, elytris minute nigro maculatis, antennis, palpis pedibusque, testaceis. Antennis brevibus, apice attenuatis, articulo 3° elongato ; capite thoraceque sulcatis ; elytris subparallelis. Long. 10-15 mill. République Argentine : Rio Salado (Wagner). — Voisin de *L. flavogrisea* Haag et distinct, à première vue, par les antennes entièrement testacées.

Lytta (Epicauta) dilatipennis n. sp. Oblongus, postice dilatatus, convexus, niger, dense griseo pubescens, supra multi et minute nigro maculatus, pedibus brunnescentibus ; pygidio prominulo. Long. 15-16 mill. République Argentine (Wagner). — Espèce remarquable et très distincte par sa formejointe à ses nombreuses petites macules noires.

Lytta (Epicauta) boliviana n. sp. Parum elongatus, niger, sat dense griseo pubescens, articulo 1° antennarum ad basin femoribusque medio late rufescentibus. Capite thoraceque sulcatis, illo breve ; elytris parum latis, apice minute dehiscentibus. Long. 17 mill. Bolivie. — Voisin de *L. geniculata* Haag et facilement séparable par la coloration des pattes en majeure partie noire.

Lytta (Epicauta) annulipes n. sp. Satis elongatus, nitidus, mediocre pubescens, niger, femoribus medio late,

rufo-testaceis. Capite thoraceque sulcatis, elytris costulatis. Long. 10-11 mill. Chili. — Moins pubescent et moins large que le précédent avec le 1er article des antennes entièrement noir. Peut-être variété de *L. femoralis* Sol.

Lytta (Epicauta) centralis v. nov. ochraceo cincta. Capite lateraliter, thoraceque ochraceo pubescentibus et elytris ochraceo cinctis. République Argentine.

Lytta (Epicauta) bogotensis n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufescens, antennis, palpis pedibusque pro parte nigris, capite rubro, thorace piceo bimaculato, elytris ad basin bi et minute, atque ante apicem late, nigro maculatis. Long. 18 mill. Bogota. — Cette jolie espèce peut se placer près de *L. funesta* Chevr.

Lytta Reichembachi v. nov. brunneo reducta. Elytris testaceis, ad humeros et ante apicem brunneo notatis. Equateur.

Lytta colombiana n. sp. Elongatus, nitidus, parum pubescens, niger, thorace rubro, capite inter oculos longe rufo notato. Capite satis breve, insulcato, sparse punctato ; antennis subfiliformibus ; thorace elongato, antice valde angustato, minute punctato ; elytris subparallelis, rugulosopunctatis. Long. 20 mill. Colombie. — Voisin de *L. sanguinithorax* Haag, mais tête non canaliculée, à grande tache rouge, élytres sans nervures distinctes, etc.

Lytta riojanensis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, fere glaber, niger, thorace testaceo, capite inter oculos breve testaceo maculato. Capite breve, subsulcato, minute et sparse punctato ; articulo 5° antennarum in mare robusto, transverso dentato, aut elongato ♀ ; thorace elongato, antice angustato, fere impunctato ; elytris satis brevibus, rugoso-punctatis, subcostatis. Long. 10-12 mill. République Argentine : La Rioja. — Diffère du précédent par la structure des antennes, la forme plus courte des élytres, le prothorax à coloration testacée et non rougeâtre.

Lytta (Epicauta) Wagneri n. sp. Elongatus, dense griseo pubescens, niger, elytris, palpis pedibusque testaceis. Capite breve, sulcato ; antennis subfiliformibus ; thorace breve, sulcato, in disco subgibboso ; elytris satis elongatis, ad medium mediocre dilatatis ; pedibus satis validis. Long. 12 mill. République Argentine : Rio Salado (Wagner). — Peut se placer près de *L. callosa* Lec.

Lytta (Pyrota) submetallica n. sp. Angustatus, nitidus, parum pubescens, niger, pro parte, et parum distincte, viridi-metallicus. Capite satis lato, minute rufo notato ; antennis satis validis, articulis 4 et sequentibus elongatis ; thorace elongato, antice valde angustato, in disco late impresso, fere impunctato ; elytris elongatis apice subattenuatis ; pygidio prominulo ; pedibus satis validis. Long. 27 mill. Guatemala. — Espèce des plus distinctes par sa forme jointe à sa coloration. Ressemble un peu (ex figure) à *L. sanguineovittata* Chp.

Lytta (Pyrota) v. nov. semicinctipennis. Niger, elytris testaceo cinctis. Guatemala. — Cette variété est très distincte par l'oblitération de la bande présuturale testacée.

Lytta (Pyrota) nigrovittata v. nov. Adolphi (Chevr.) Supra testaceus, thorace nigro 4-maculato, elytris testaceis, in disco postice longitudinaliter nigro lineatis et ad scutellum breve piceo maculatis, articulo 1° et 2° antennarum rufis. Mexique.

Lytta (Pyrota) mendesensis n. sp. Elongatus, parum nitidus, pro parte niger, pro parte testaceus, capite thoraceque testaceis, nigro multi maculatis, antennis nigris ; elytris piceis, pallido-testaceo cinctis ; pedibus nigris, femoribus infra tibiisque pro parte testaceis ; pectore bicolore. Long. 20-22 mill. Brésil : Mendès. — Voisin de *P. tenuicostata* Duges, mais élytres plus étroitement bordés, avant-corps autrement maculé de noir.

Lytta (Pyrota) Schneideri n. sp. Elongatus, niti-

dus, pro parte niger, pro parte testaceus, capite thoraceque nigro maculatis, antennis nigris, elytris testaceis, singulo nigro 4-signatis (maculis diabus basalibus, macula lata submediana, litura arcuata ante apicem), pedibus nigris, femoribus et tibiis pro parte testaceis ; infra corpore pro parte nigro, pro parte testaceo. Long. 15 mill. Brésil (Schneider). — Très distinct de *L. punctata* Casey par le prothorax trimaculé de noir (la macule médiane étant grosse) et par la grande macule postmédiane noire des élytres.

Lytta (Pyrota) Schneideri v. nov. 10-notata. Elytris in singula maculis quinque nigris (2, 2, 1) et minutis ornatis. Brésil. — Dessins noirs des élytres plus réduits que chez forme type avec 2 macules médianes, au lieu d'une fascie, sur chaque élytre.

Strongylium s.-gen. nov. Pedostrongylium. Corpus subelongatus ; oculis distantibus ; antennis plus minusve gracilibus ; thorace subquadrato, lateraliter mediocre et subsinuato marginato ; coxis intermediis validis, pedibus intermediis longissimis. Le type du sous-genre est **St. luteonotatum nov.**, mais les quatre autres qui suivent peuvent rentrer dans le même groupement.

Strongylium luteonotatum n. sp. Subelongatus, nitidus, niger, capite, antennis ad basin, pedibus antice pro majore parte, thorace (illo in disco et lateraliter nigro maculato) abdomineque apice luteis, elytris nigris, ad basin breve et post medium late luteis, his striato punctatis. Long. 13 mill. Congo. — Espèce des plus distinctes par sa coloration particulière.

Strongylium pallidicolor n. sp. Subelongatus, nitidus, luteus, pedibus pro majore parte nigris, antennis nigris, articulo ultimo rufo, pectore lateraliter, nigro notato ; elytris mediocre lineato-punctatis. Long. 12 mill. Dahomey. — En outre de la coloration diffère du précédent

par le prothorax moins fortement ponctué ; les élytres sans stries distinctes, à intervalles plus larges.

Strongylium rufoapicale n. sp. Subelongatus, nitidus, niger, capite thoraceque minute rufo notatis, articulo ultimo antennarum testaceo, infra corpore pro majore parte testaceo, elytris nigris, apice rufescentibus, ad basin et ad medium transverse luteo fasciatis, antice lateraliter luteo limbatis, his striato-punctatis. Long. 12 mill. Gabon : Benito. — Un peu plus allongé que *S. luteonotatum* Pic, avec les antennes robustes et la coloration différente. Sans doute voisin de *S. xanthosonum* Thoms.

Strongylium Mocquerysi n. sp. Subelongatus, nitidus, rufus, scutello, antennis pro parte, infra corpore pedibusque intermediis et posticis nigris. Thorace dense punctato, in disco biimpresso ; elytris striato-punctatis, intervallis subcarinatis. Long. 13 mill. Gabon (Mocquerys). — Diffère des précédents, en plus de la coloration, par les intervalles très étroits et costiformes des élytres, les impressions du prothorax, etc.

Strongylium nigroapicale n. sp. Angustatus, nitidus, supra rufus, pro parte nigro notatus, infra pro majore parte niger, antennis nigris, apice testaceis, pedibus nigris, femoribus ad basin testaceis. Capite thoraceque medio nigro lineatis, illo biimpresso et dense punctato : scutello nigro ; elytris rufis, apice late et ad suturam postice nigro notatis, striato-punctatis, intervallis subcarinatis. Long. 12 mill. Côte-d'Ivoire. — Plus étroit que le précédent et de coloration différente.

Amenophis cæruleus n. sp. Oblongo-subelongatus, nitidus, fere glaber, cæruleo-metallicus. Thorace transverso, lateraliter subarcuato, mediocre et sparse punctato ; elytris satis latis, convexis, late sulcatis, interstitiis convexis. Long. 23 mill. Congo français. — Voisin de *A. Fairmairei* Thoms., mais élytres à stries profondes, non ponctuées avec seulement quelques traces de plis transversaux.

Amenophis atricolor n. sp. Oblongus, nitidus, fere glaber, niger. Thorace transverso, minute et sparse punctato ; elytris latis, apice subacuminatis, minute striato-punctatis, lateraliter et apice subalutaceis. Long. 20 mill. Côte-d'Ivoire, — Moins convexe et moins large que le précédent, en outre de la coloration bien différente.

Amenophis Mocquerysi n. sp. Oblongus, supra parum nitidus, piceo-rufescens, fere glaber. Thorace transverso, in disco minute et sparse punctato ; elytris satis latis, apice subacuminatis, lineato punctatis, vage striatis. Long. 21 mill. Gabon (Mocquerys). — En outre de la coloration plus claire, les stries élytrales sont plus faibles, enfin, les élytres sont de forme moins élargie que le précédent.

Pseudamenophis n. gen. Antennis satis brevibus, articulis 5 et sequentibus dentatis ; thorace transverso, lateraliter sinuato marginato ; labro prominulo ; prosterno postice dentato et mesosterno antice bidentato ; tibiis satis brevibus, sulcatis, anticis sinuatis. — Ce nouveau genre, qui a un faciès de *Hyperchalca* Frm., est voisin de *Amenophis* Thoms., dont il diffère, entre autres caractères, par les tibias antérieures plus courts et sinués, le prothorax particulier (court et large), à rebord sinué.

Pseudamenophis æneus n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, nitidus, nigro-æneus. Thorace breve, transverso, lateraliter fere recto, in medio fortiter sat sparse punctato ; elytris thorace paulo latioribus, ad basin subimpressis, apice subacuminatis, late punctato striatis, intervallis subconvexis ; infra corpore griseo sparse pubescente. Long. 18 mill. — Gabon : Benito.

Asbolodes rufofasciatus n. sp. Robustus, subnitidus, niger, infra copore elytrisque rufo notatis. Thorace lateraliter sinuato et subtuberculato, minute et sparse punctato, elytris ad basin rufo maculatis et rufo bigibbosis, post medium rufo fasciatis, ante apicem rufo maculatis, postice

valde attenuatis, minute striato-punctatis ; femoribus rugoso punctatis. Long. 10 mill. Sumatra. — Espèce intermédiaire entre les 2 espèces décrites par Fairmaire et très distincte par ses tubercules roux et ses élytres non concolores.

Pseudeucyrtus n. gen. Capite breve, antice truncato ; antennis brevibus, apice dilatatis ; thorace marginato, antice in medio insulcato, lateraliter bi aut tri carinato ; elytris validis, fortiter marginatis et lateraliter plus minusve sulcatis ; femoribus inermis, elongatis. — Genre voisin de *Eucyrtus* Pascoe caractères généraux de ce genre, distinct, à première vue, par la particulière structure de son prothorax, cet organe présentant, en dehors de la carène latérale, une ou deux autres carènes internes, l'une au moins entière.

Pseudocyrtus niasensis n. sp. Satis latus, subconvexus, nitidus, æneus, infra corpore piscescente, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus aut purpureis. Thorace transverso, lateraliter fere recto, antice subimpresso, minutissime et disperse punctato ; elytris latis, subparallelis, apice attenuatis, indistincte striatis, minute lineato-punctatis, apice subsulcatis. Long. 12 mill. Ile Nias.

Pseudeucyrtus subrufus n. sp. Modice latus, subconvexus, nitidus, antennis apice piceis, pedibus et infra corpore rufescentibus, supra nigro-æneus. Long. 10 mill. Sumatra. — Un peu moins large que le précédent avec la coloration du dessus plus sombre et le prothorax un peu moins transversal.

Pseudeumolpus n. s.-gen. Phædeucyrtus. Thorace marginato, antice distincte inciso et in medio insulcato ; epipleuris antice dilatatis ; pedibus validis, femoribus anticis fortiter dentatis, intermediis et posticis minute subdentatis. — Ce nouveau sous-genre se distingue, à première vue, par la structure femorale des pattes intermédiaires et postérieures, les fermurs étant courtement dentés en dessous

près de leur sommet, ensuite faiblement échancrés vers les genoux.

Phædeucyrtus obscuripes n. sp. Oblongus, postice subacuminatus, nitidus, cupreus, capite thoraceque pro parte purpureis, antennis ad basin, epipleuris et infra corpore rufescentibus, antennis apice pedibusque nigris. Thorace transverso, circa sinuato ; elytris satis elongatis, lineato-punctatis, intervallis deplanatis. Long. 13 mill. Zanzibar (Raffray).

Pseudeumolpus tonkineus n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, cupreus, pro parte viridescens, infra corpore, antennis pedibusque nigris. Thorace transverso, lateraliter subarcuato, in disco impresso, mediocre sat dense punctato ; etytris satis brevibus, subparallelis, postice attenuatis, substriato-punctatis, intervallis latis, subdepressis. Long. 15 mill. Tonkin. — Espèce très distincte de *P. seriatoporus* Fairm., par sa coloration et sa ponctuation.

Pseudeumolpus viridescens n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, viridi-metallicus, infra corpore pro parte nigro-cæruleo, antennis pedibusque nigris. Thorace transverso, lateraliter subarcuato, minute sat sparse punctato ; elytris mediocre lineato-punctatis, indistincte striatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Plus étroit que le précédent avec les élytres à peine striés, en outre coloration différente.

Pseudeumolpus planicollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, supra nigro-æneus, pro parte æneo subviridis, infra corpore rufescente, antennis pedibusque nigris. Thorace transverso, lateraliter subarcuato ; ab basin deplanato, minute et sparse punctato ; elytris convexis, subparallelis, apice attenuatis, lineato-punctatis. Long. 9 mill. ? Sumatra. — Voisin du précédent, coloration et prothorax différents.

Pseudeumolpus atricollis n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, niger, pro parte subcœruleus, elytris purpu-

reis, striis punctatis viridescentibus. Thorace breve, lateraliter sinuato, minute sat sparse punctato ; elytris satis latis, apice attenuatis, mediocre substriato-punctatis. Long. 10 mill. Sumatra : Tengah. — Peut se placer près de *P. bicolor* Kr., mais le prothorax n'a pas de reflets bleus, les élytres sont pourprés et linéolés de vert.

Pseudeumolpus purpureipennis n. sp. Oblongus, subconvexus, nitidus, niger, capite thoraceque cœruleo-viridescentibus, elytris purpureis, fortiter lineato-punctatis. Thorace lateraliter subarcuato, in disco irregulariter et mediocre punctato ; elytris parum latis, subparallelis, apice attenuatis. Long. 9 mill. Bornéo : Brunei. — Peut se placer près de *P. semiarmatus* Frm. et distinct, à première vue, par la coloration pourprée des élytres.

Pseudeumolpus bruneiensis n. sp. Oblongus, subconvexus, nitidus, supra antice viridis et violaceo tinctus, elytris cupreo-viridescentibus, infra corpore pedibusque nigro-piceis. Thorace transverso, lateraliter sinuato, minute sat sparse punctato ; elytris satis brevibus, convexis, minute lineato-punctatis, fere instriatis. Long. 10 mill. Bornéo : Brunei. — Prothorax plus déprimé que chez la précédente espèce, ponctuation en rangée, des élytres, plus fine et plus rapprochée, en outre de la coloration différente.

Pseudeumolpus brevipennis n. sp. Oblongus, robustus, subconvexus, nitidus, viridi-cæruleus, elytris cupreis, minute lineato punctatis. Long. 13 mill. Ile Banguey. — Diffère du précédent par la forme plus robuste, avec les angles postérieurs du prothorax plus droits et le dessous plus foncé.

Pseudeumolpus semicyaneus n. sp. Oblongus, parum convexus, nitidus, supra antice viridi-cæruleus, elytris æneo-piscescentibus, infra corpore pedibusque pro parte rufescentibus. Thorace transverso, lateraliter subsinuato, minute sat sparse punctato ; elytris post medium minute dilatatis et apice subacuminatis, minute striato-punctatis.

Long. 16 mill. Sumatra. — Peut se placer près de *P. pretiosus* Kr., avant-corps à coloration presque uniforme, élytres moins convexes et autrement colorés.

Pseudeumolpus rufipes n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, subconvexus, nitidus, pro parte rufescens aut piceus, antennis apice geniculisque nigris, elytris cupreis. Long. 17 mill. Bornéo : Kina-Balu. — Très voisin du précédent, forme plus allongée, pattes plus claires, etc.

Pseudeumolpus subopacus n. sp. Oblongo-elongatus, antice posticeque attenuatus, parum convexus, subopacus, rufescens, nigro marginatus, antennis apice piceis. Long. 13 mill. Kina Balu. — Moins brillant et moins convexe que le précédent, avec la coloration différente, plus claire.

Pseudeumolpus pulcher n. sp. Minutus, oblongus, subconvexus, infra corpore, antennis pedibusque nigris pro parte subviridescentibus, supra purpureo et cœruleo-virescente mixtus, elytris ad medium viridi aut aurato transverse lineolatis, et late transverse purpureis, his substriatis, fortiter lineato-punctatis. Long. 8 mill. Ile Nias. — A placer près de *P. castaneipes* Frm., mais pattes et dessous plus foncés.

Crioceris latefasciata n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, 4 tibiis et tarsis posticis nigris, elytris rufis, postice late nigro fasciatis. Long. 9 mill. Java. — Voisin de *C. binotatipennis* Pic, dessins des élytres différents, ponctuation des élytres plus régulière, etc.

Crioceris validicornis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, thorace et pedibus pro parte pallidioribus, elytris testaceis, rufo punctatis, articulis 6-11 antennarum unguiculisque nigris, antennis validis. Thorace breve et lato, ad medium distincte coarctato, in disco minute et disperse punctato ; elytris substriatis, fortiter lineato-punctatis.

Long. 8 mill. Sierra Leone. — Espèce très distincte par ses membres robustes et sa ponctuation à fond roussâtre sur les élytres. Peut se placer près de *Weisei* Chevr.

Crioceris thibetana n. sp. Robustus, nitidus, niger, collo, thorace elytrisque rufis. Thorace breve, ad medium valde coarctato, in disco disperse et sat fortiter punctato ; elytris minute sed distincte lineato-punctatis. Long. 7 mill. Thibet. — A placer près de *C. malabarica* Jac., coloration de la tête et des membres plus foncée, forme plus trapue, etc.

Crioceris latior n. sp. Robustus, nitidus, rufus, antennis, pectore, geniculis et tarsis nigris. Capite in vertice bigibboso ; thorace breve, ad medium constricto, in disco longitudinaliter subsulcato ; elytris antice distincte et fortiter lineato-punctatis. Long. 8 mill. Chine. — A placer près de *C. brunnea* L.

Crioceris scapularis Baly. Varie par la macule jaune antérieure des élytres plus ou moins oblitérée. Je possède les variétés suivantes, originaires de Corée :

Var. nov. coreana. Elytris ad humeros fascia rufa reducta et undulata ornatis, puncto humerali nigro.

Var. nov. bilineata. Elytris ad basin et longitudinaliter lineolis duabus rufis ornatis.

Var. nov. reducta. Elytris nigris, ante medium in disco breve rufo maculatis.

Crioceris pallidipes n. sp. Oblongus, nitidissimus, pallido-testaceus, oculis nigris, antennis elongatis. Thorace satis breve, ad medium valde coarctato, postice tranverse sulcato, minute et parum distincte punctato ; elytris antice lineato punctatis, postice substriatis. Long. 11. mill. Cochinchine. — Voisin de *C. consentaneus* Lac. et distinct, à première vue, par les pattes pâles.

Falsomegalopus diformipes. — Angustatus, subparallelus, nitidus, rufo-testaceus, capite, antennis, tibiis tarsisque posticis nigris, femoribus infra nigro maculatis ; elytris pro majore parte nigro cinctis et lineola humeralis nigra ornatis ; tibiis posticis in mare validis, infra excavatis, ad medium subdentatis. Long. 9-10 mill. Brésil. — Diffère de *F. guyanensis* Pic, par les hanches postérieures simplement tuberculées chez ♂, la forme des tibias et par le prothorax immaculé sur le disque.

Falsomegalopus incisus n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, testaceus, capite, antennis et infra corpore pro parte nigris, elytris testaceis, lateraliter nigro marginatis et lineola humeralis nigra ornatis, tibiis posticis validis, ante apicem incisis ad medium dentatis. Long. 10 mill. Brésil. Très distinct du précédent, par la structure des tibias postérieurs et, en outre, par ces organes testacés.

Megalopus annulipes n. sp. Robustus, postice attenuatus, nitidus, niger, elytris postice late rufescentibus aut griseis, tibiis posticis ad basin testaceis et femoribus testaceis, medio late piceo notatis. Long. 8 mill. Caracas. — De coloration analogue à *M. gibbosus* Pic, bien distinct par sa structure élytrale normale, déprimée sur toute la partie postérieure de ces organes ainsi que par les tibias postérieurs plus longs et moins épais. A placer près de *M. cruralis* Klug.

Megalopus unifasciatus n. sp. Robustus, postice parum attenuatus, nitidus, niger, thorace circa, infra corpore femoribusque pro parte testaceis, elytris nigris, apice rufescentibus, infra humeros externe testaceo maculatis et ad medium transverse luteofasciatis. Thorace sparse punctato, nigro, testaceo cincto ; elytris antice dense et rugose punctatis, apice sublævibus ; tibiis posticis valde curvatis. Long. 9 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa coloration ; peut se placer près de *M. thoracicus* Jac.

Mastostethus disjunctus n. sp. Robustus, postice attenuatus, nitidus, rufescens, infra pallidior, capite thoraceque nigro maculatis, antennis, tibiis tarsisque posticis nigris, elytris ad medium lateraliter nigro maculatis et ante apicem transverse nigro fasciatis ; aut aliquot macula mediana fere obliterata, punctiformis et thorace immaculato (**var. nov. Le Moulti**). Long. 10-11 mill. Guyane. — Voisin de *M. distinctus* Lac., mais élytres testacés à l'extrémité et dessins foncés, médians, de ces organes faits, sur chaque élytre, d'une macule triangulaire à pointe dirigée en dedans.

Mastostethus nigrovarius var. nov. bisbidisjunctus. Fascia prima nigra elytrorum reducta et fascia basalis externe separata. Brésil.

Mastostethus unifasciatus n. sp. Oblongus, postice parum attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pedibusque pro parte nigris, elytris nigris, post medium transverse et late testaceo fasciatis. Antennis satis elongatis ; thorace breve, valde transverso ; elytris brevibus. Long. 9-10 mill. République Argentine. — Voisin de *M. peruensis* Jac. par sa coloration, mais la fascie élytrale est plus droite et le prothorax est immaculé.

Mastostethus lineatus n. sp, Oblongus, postice parum attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis, infra corpore et pedibus pro parte nigris, elytris nigris, antice oblique posticeque transverse testaceo fasciatis, ad humeros testaceo maculatis. Long. 10 mill. Guyane française. — Très voisin du précédent, distinct, à première vue, par les dessins différents des élytres.

Mastostethus tricolor v. nov. rufescens. Elytris rufis, lateraliter et antice nigro limbatis, his quinque flavo maculatis. Pérou. — Diffère, de la forme type, au moins par la coloration foncière des élytres rousse.

TABLE

POUR LE VINGT-ET-UNIÈME FASCICULE

Pages.

Introduction 1

Descriptions abrégées diverses 2